

KOMMENTAR fra OVARIECANCERARBEJDSGRUPPEN vedr. DESKTOP III

De første resultater af DESKTOP III -studiet blev præsenteret på ASCO i juni: Man fandt en forbedring i den progressionsfri overlevelse på 5,6 måneder for patienter, der fik operation + kemoterapi mod kemoterapi alene, hos patienter med første recidiv af ovariecancer. Tiden til første efterfølgende kemoterapi var 21 måneder blandt de opererede mod 13,9 måneder blandt dem, der alene havde fået kemoterapi. Konklusionen efter disse første resultater af studiet er, at vi må afvente data vedrørende den absolutte overlevelse, før man definitivt kender betydningen af kirurgi ved recidiv, men at man skal overveje dette behandlingstilbud hos patienter med positiv AGO score. Ovariecancergruppen har i september drøftet dette abstrakt (J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 5501)) og afventer revision af retningslinierne, til de endelige analyser foreligger, idet der på nuværende tidspunkt altså ikke er oplysninger om bl.a. tid for recidiv, hvorledes recidivet er fundet (CA-125, symptomer, klinisk kontrol, osv.), eller om effekten på den samlede overlevelse. De foreløbige resultater giver derfor ej heller anledning til ændringer i nuværende anbefalinger for opfølgning.