

LPR3-kodning af kræft i livmoderen gældende fra 1. august 2024

(kræft i livmoderen også benævnt corpus cancer eller endometrie cancer)

Anmeldelsespligtige diagnoser

Canceranmeldelse til Cancerregistret via LPR omhandler *den enkelte sygdom*.

Udviklingen i sygdommen kan repræsenteres af forskellige diagnosekoder på forskellige tidspunkter i forløbet, men der er stadig tale om *den samme* anmeldelsespligtige sygdom. Dette inkluderer lokal eller dissemineret recidiv, metastasering og anden form for progression af sygdommen.

PRIMÆR SYGDOM

Når mikroskopisvar foreligger efter primær operation

eller

Ved henvisning til kurativt intenderet/pallierende onkologisk behandling

Eller

Ved henvisning til rent palliativ behandling uden operation og kemoterapi

Kodevejledningen ved primær sygdom er opbygget over obligate koder for

1) A-diagnose (primær tumor)

2) Tillægskoder

a. Metastasestatus, (*m-kode*). Der skal angives minimum 1 kode

b. Sideangivelse

3) Canceranmeldelse (anmeldelsesstatus, makroskopisk og mikroskopisk diagnosegrundlag samt TNM)

4) B-diagnose

a. Yderligere relevante b-diagnoser for komorbiditet

1) A-diagnose (primær tumor)

Livmoderkræft	DC549
---------------	-------

2) Tillægskoder

Metastasestatus (*m-kode*) Der skal angives minimum 1 kode

Ingen fjernmetastaser påvist	DZ061A
Fjernmetastase uspecificeret	DC798D

3) Canceranmeldelse (anmeldelsesstatus, makroskopisk, mikroskopisk diagnosegrundlag samt TNM)

Anmeldelsesstatus

Ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen	AZCA1
--	-------

Klinisk makroskopisk diagnosegrundlag

Operation (inkl. biopsi)	AZCK0
Billeddiagnostisk undersøgelse	AZCK2
Klinisk undersøgelse	AZCK4

Klinisk mikroskopisk diagnosegrundlag

Histologi/cytologi fra primær tumor	AZCL0
Histologi fra metastase	AZCL1
Histologi/cytologi, uvist om fra primær tumor eller metastase	AZCL2
Ingen histologisk/cytologisk/klinisk-mikroskopisk undersøgelse	AZCL9

Corpus uteri – carcinomer

FIGO	TNM	Klinisk	T-kode
Stadium I		Tumor begrænset til uterus	
IA	T1A N0 M0	Involvering af endometriet, myometrieinvasion < 50 %	AZCD13A
IB	T1B N0 M0	Myometrieinvasion ≥ 50% af myometriets tykkelse	AZCD13B
Stadium II	T2 N0 M0	Invasion af cervikale stroma	AZCD14
Stadium III		Lokal og/eller regional spredning	
IIIA	T3A N0 M0	Involvering af uterus serosa og/eller adnex(ae)	AZCD15A
IIIB	T3B N0 M0	Involvering af vagina og/eller parametrium	AZCD15B
IIIC	T1-3B N1 M0	Spredning til lymfeknuder	Any T (<AZCD16)
IIIC1	T1-3B N1 M0	Pelvine lymfeknude metastaser	Any T (<AZCD16)
IIIC2	T1-3B N1 M0	Paraaortale lymfeknude metastaser	Any T (<AZCD16)
IVA	T4A N0/N1 M1	Tumor invaderer mucosa i blære og/eller tarm	AZCD16A
IVB	T4BN0/N1 M1	Intraabdominale metastaser incl. ingvinale lymfeknuder og/eller intra-umbilical metastase	AZCD16B

Corpus uteri – leiomyosarkomer og Endometrial stromal sarkom (ESS)

FIGO	TNM	Klinisk	T-kode
Stadium I		Tumor begrænset til uterus	
IA	T1A N0 M0	<5 cm	AZCD13A
IB	T1B N0 M0	≥ 5 cm	AZCD13B
Stadium II		Tumor udbredt til bækken	
IIA	T2A N0 M0	Involvering af adnex(ae)	AZCD14A
IIB	T2B N0 M0	Tumor involverer extrauterint væv i bækken	AZCD14B
Stadium III		Invaderer abdominalt væv	
IIIA	T3A N0 M0	Invaderer kun ét sted	AZCD15A
IIIB	T3B N0 M0	Invaderer flere steder	AZCD15B
IIIC	T1-3B N1 M0	Pelvine og/eller paraaortale lymfeknude metastaser	Any T (<AZCD16)
IVA	T4A N0/N1 M1	Tumor invaderer blære og/eller rectum	AZCD16A
IVB	T4B N0/N1 M1	Fjernmetastaser	AZCD16B

Corpus uteri - Adenosarcomas

FIGO	TNM	Klinik	T-kode
Stadium I		Begrænset til uterus	
IA	T1A N0 M0	Involverer kun endometriet/endocervix, ingen myometrieinvasion	AZCD13A
IB	T1B N0 M0	myometrieinvasion $\leq$ 50 %	AZCD13B
IC	T1C N0 M0	myometrieinvasion $>$ 50 %	AZCD13C
Stadium II		Tumor udbredt til bækken	
IIA	T2A N0 M0	Involverer adnex(ae)	AZCD14A
IIB	T2B N0 M0	Tumor involverer extrauterint væv i bækken	AZCD14B
Stadium III		Invaderer abdominalt væv	
IIIA	T3A N0 M0	Invaderer kun ét sted	AZCD15A
IIIB	T3B N0 M0	Invaderer flere steder	AZCD15B
IIIC	T1-3B N1 M0	Pelvine og/eller paraaortale lymfeknude metastaser	AZCD15C
IVA	T4A N0/N1 M1	Tumor invaderer blære og/eller rectum	AZCD16A
IVB	T4B N0/N1 M1	Fjernmetastaser	AZCD16B

N-koder

cN0: Ingen regionale lymfeknudemetastaser	AZCD30
cN1: Regional lymfeknudemetastase	AZCD31
cN1a(sn): Sentinel lymfeknudemetastase	AZCD31A1

M-koder

cM0: Ingen fjernmetastaser	AZCD40
cM1: Fjernmetastase	AZCD41

4) B-diagnose (Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet)

OPFØLGNING

Kodevejledningen er opbygget over obligate koder for

- 1) **A-diagnose** (eks. Kontrol efter operation af kræft i æggestok)
- 2) **Tillægskoder**
 - a. Recidivstatus. Der skal angives minimum 1 kode
- 3) **B-diagnose**
 - a. Yderligere relevante B diagnoser for komorbiditet eks. fedme, hypertension etc.

1) A-diagnose

Kontrol efter operation af kræft i livmoder	DZ080L
Kontrolundersøgelse efter kemoterapi af kræft i livmoder	DZ082L
Kontrolundersøgelse efter strålebehandling af kræft i livmoder	DZ081L
Kontrolundersøgelse efter kombineret behandling af kræft i livmoder	DZ087L

2) Tillægskode (recidiv status) Der skal angives minimum 1 kode

Intet recidiv (normalt undersøgelsesresultat)	ZPR01N
Recidiv	ZDW51F

3) B-diagnose:

Husk yderligere relevante B diagnoser

Eksempel

A-diagnose: kontrolundersøgelse efter operation af livmoderkræft

DZ080L

Tillægskode: Intet recidiv

ZPR01N

B-diagnose: Hypertension

DI109

RECIDIVFORLØB

Som *A diagnose* skal recidiv lokalisation angives.

Som *B-diagnose* skal primær cancer registreres med de tidligere registrerede tillægskoder for metastasestatus samt AZCA4 Sygdommen tidligere fuldt anmeldt af afdelingen.

Kodevejledning:

- 1) **A-diagnose:** Lokalisation af recidiv (f.eks. lokalrecidiv uspec, DC991) (lokalt, regionalt eller fjernrecidivdet mest omfattende)
- 2) **B-diagnose: primær cancer** (livmoderkræft)
- 3) **Tillægskode B diagnose** (primær cancer)
 - a. **Metastase status**
 - b. **Yderligere comorbiditet**
- 4) **Canceranmeldelse AZCA2** (tillægskode til b-diagnosen primær cancer ved recidiv)

Ved mistanke om recidiv diagnose – obs diagnosen er *A-diagnose*

1) A-diagnose

Obs. pga mistanke om recidiv af kræft i livmoderen	DZ031K2R
--	----------

Eksempel

A-diagnose: Obs. pga. mistanke om recidiv af livmoderkræft DZ031K2R

B-diagnose: Komorbiditet eks hypertension DI109

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

Ved verificeret recidiv

Der er tre scenarier med verificeret recidiv

- Verificeret isoleret lokalrecidiv
- Verificeret regionalrecidiv med/uden lokalrecidiv uden fjernmetastaser
- Dissemineret recidiv/fjernrecidiv med uden lokalt/regionalt recidiv

Isoleret lokalrecidiv (uden regionalt recidiv eller fjernmetastaser) - recidiv diagnosen er *A-diagnose*.

A-diagnose relaterer til lokalisation af recidivet og ikke af primær tumor.

1) A-diagnose

Lokalrecidiv UNS	DC991
------------------	-------

2) B-diagnose - Primærcancer med tilhørende tillægskoder

Kræft i livmoderen	DC549
--------------------	-------

3) Tillægskode (til B-diagnose)

Metastase status

Recidiv	ZDW51F
---------	--------

Ingen lymfeknudemetastaser påvist	DZ062A
Ingen fjernmetastaser påvist	DZ061A

4) Canceranmeldelse

Klinisk recidiv	AZCA2
-----------------	-------

Eksempel:

A-diagnose: Lokalrecidiv uspecificeret

DC991

B-diagnose: Vulvacancer

DC519

>Recidiv

ZDW51F

>Ingen Lymfeknudemetastaser påvist

DZ062A

>Ingen fjernmetastaser påvist

DZ061A

Canceranmeldelse: Klinisk recidiv/Sygdommen tidligere anmeldt af afd. AZCA2

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

Regionalt recidiv – denne er A-diagnose

Når patienten har regionalt +/- lokaliseret recidiv skal metastasekoden relatere til placeringen af recidivet og ikke til lokalisation af primær tumor (vælg en af nedenstående)

1) A-diagnose

Regional intrapelvin lymfeknudemetastase	DC775A1
--	---------

2) B-diagnose primær cancer (med tilhørende tillægskoder)

Kræft i livmoderen	DC549
--------------------	-------

3) Tillægskode til B diagnose

Metastase status

Recidiv	ZDW51F
Intet lokalrecidiv påvist	DZ063A
Ingen fjernmetastaser påvist	DZ061A

4) Canceranmeldelse

Klinisk recidiv	AZCA2
-----------------	-------

Eksempel (isoleret regionalt recidiv)

Indtil videre da koden ikke er godkendt må i stedet bruges følgende som A-diagnose, da det oftest er i recidiv i regional lymfeknude

A-diagnose: Regional intrapelvin lymfeknudemetastase UNS

DC775A1

Tillægskoder:

> recidiv

ZDW51F

B-diagnose: kræft i livmoderen
>Recidiv
> Ingen fjernmetastaser påvist

DC549
ZDW51F
DZ061A

> Intet lokalt recidiv påvist

Canceranmeldelse: Klinisk recidiv

DZ063A

AZCA2

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

Fjernrecidiv – recidiv diagnosen er *A-diagnose*, som relaterer til lokalisation af recidivet og ikke af primær tumor.

1) A-diagnose

Fjernmetastase uspecificeret	DC798
------------------------------	-------

2) B-diagnose -primær sygdom (en af nedenstående)

Kræft i livmoderen	DC549
--------------------	-------

3) Tillægskode til B-diagnose

Metastase status

Recidiv	ZDW51F
Intet lokalrecidiv påvist (hvis relevant)	DZ063A
Ingen lymfeknudemetastaser påvist (hvis relevant)	DZ062A

4) Canceranmeldelse

Klinisk recidiv	AZCA2
-----------------	-------

Eksempel

A-diagnose: Fjernmetastase specificeret

DC798

B-diagnose: livmoderkræft

DC549

>Recidiv

ZDW51F

>Intet lokalrecidiv påvist

DZ063A

>Ingen lymfeknudemetastaser påvist (hvis relevant)

DZ062A

Tillægskode: Canceranmeldelse

AZCA2

Husk yderligere relevante B-diagnoser for komorbiditet

OPERATION

Laparoskopisk (robotassisteret) operation

Kodevejledningen er opbygget over følgende koder for

- 1) Primær procedurekoder (hysterektomi er primær kode)
- 2) Tillægskoder
 - a. Radikalitet
 - b. Anvendelse af robot (ved laparoskopiske)
- 3) Øvrige operationskoder

1) Primær procedurekode

UTERUS (primær koden)	
Total laparoskopisk hysterektomi m. laparoskopisk suturering af vaginaltoppen	KLCD01A
Total laparoskopisk hysterektomi med vaginal suturering af vaginaltoppen	KLCD01B
Laparoskopisk hysterektomi	KLCD04
Radikal laparoskopisk hysterektomi	KLCD31

2) Tillægskoder

a) Radikalitet (tilføjes til den primære procedure kode)

Efterladt tumorvæv (ikke makroradikalt opereret, R>0)	ZPY1B01
Ikke efterladt tumorvæv (makroradikalt opereret, R=0)	ZPY1B02

b) Anvendelse af robot ved laparoskopisk indgreb (tilføjes alle procedurekoder)

Anvendelse af robot	KZXX00
---------------------	--------

3) Øvrige procedurekoder

ADNEXAE	
Laparoskopisk enkeltsidig salpingo-ooforektomi	KLAF01
Laparoskopisk dobbeltsidig salpingo-oforektomi	KLAF11
Laparoskopisk enkeltsidig salpingektomi	KLBE01
Laparoskopisk dobbeltsidig salpingektomi	KLBE11
LYMFEKNUDER	
Laparoskopisk excision af iliakal lymfeknude (bulky nodes)	KPJD64
Laparoskopisk excision af iliakal sentinel node	KPJD64A
Laparoskopisk radikal excision af iliakale lymfeknuder	KPJD74
Laparoskopisk excision af para-aortal lymfeknuder (bulky nodes)	KPJD63
Laparoskopisk excision af para-aortal sentinel node	KPJD63A
Laparoskopisk radikal excision af para-aortale lymfeknuder	KPJD73

OMENT	
Laparoskopisk omentektomi	KJAL31
Laparoskopisk omentbiopsi	KJAL32A

Åben operation

Operationsomfang

Omfanget af kirurgi er opdelt i LAP grupperne LAP 0, LAP 1, LAP 2 eller LAP 3 på baggrund af de under indgrebet gennemførte procedurer. Hver procedure har en relevant procedurekode (se nedenfor), som skal angives, hvis det pågældende indgreb er udført under den pågældende operation. Opdelingen i LAP grupper fremgår af tabellen nedenfor. Det er **ikke** obligat, at alle procedurer er udført indenfor den enkelte LAP gruppe.

LAP 0: diagnostisk laparokopi eller eksplorativ laparotomi

LAP 1: Salpingo-ooforektomi, total hysterektomi, omentektomi, resektion af iliakale lymfeknuder, appendektomi

LAP 2: LAP 1 + mindst 1 af følgende: resektion af paraaortale lymfeknuder, splenektomi, ekstensiv pelvin perinektomi, tyndtarmsanastomose, colonresektion med stomi, komorbiditet ASA 3-4.

LAP 3: Lap 2 + mindst 1 af følgende: colonresektion med anastomose, ekstensiv perinektomi i øvre abdomen, diaphragma resektion, lever resektion, komorbiditet ASA 3-4.

Kodevejledningen er opbygget over følgende koder for

1) Primære procedurekode (hysterektomi)

2) Tillægskoder

a. Operationstype

b. Operationsomfang (LAP-koder)

c. Radikalitet

3) Øvrige procedurekoder

1) Primær procedurekoder

UTERUS primær kode	
Total hysterektomi	KLCD00
Vaginal hysterektomi	KLCD10
Radikal hysterektomi	KLCD30

2) Tillægskoder - *følgende tillægskoder essentielle*. (Disse koder skal tilføjes til den primære procedurekode)

a) Operationstype

b) Operationsomfang (LAP-koder)

c) Radikalitet

a) Operationstype

Primær operation	KZYD01
Intervalkirurgi	KZYD02
Primær operation efter forudgående diagnostisk indgreb, men erkendes inoperabel	KZYD03
Kirurgi ved recidiv	KZYR30
Staging kirurgi	KZYN03

b) Tillægskode for operationsomfang (LAP gruppe)

Denne kode skal tilføjes til den først oplyste procedurekode

LAP 0	VPH0000
LAP 1	VPH0001
LAP 2	VPH0002
LAP 3	VPH0003

c) Tillægskode for radikalitet

Denne kode skal tilføjes til den først oplyste procedure kode

Efterladt tumorvæv (ikke makroradikalt opereret, R>0)	ZPY1B01
Ikke efterladt tumorvæv (makroradikalt opereret, R=0)	ZPY1B02

3) Øvrige procedurekoder

ADNEXAE	
Enkelttidig salpingektomi	KLBE00
Dobbeltsidig salpingektomi	KLBE03
Enkelttidig salpingo-ooforektomi	KLAF00
Dobbeltsidig salpingo-ooforektomi	KLAF10
LYMFEKNUDER	
Excision af para-aortale lymfeknuder (kun fjernelse af bulky nodes)	KPJD43
Excision af iliacale lymfeknuder (kun fjernelse af bulky nodes)	KPJD44
Excision af ingvinale lymfeknuder (kun fjernelse af bulky nodes)	KPJD45
Radikal excision af para-aortale lymfeknuder (systematisk lymfadenektomi)	KPJD53
Radikal excision af iliacale lymfeknuder (systematisk lymfadenektomi)	KPJD54
Radikal excision af ingvinale lymfeknuder (systematisk lymfadenektomi)	KPJD55
PERITONEUM	
Biopsi af bughinde	KJAL00
Excision eller destruktion af patologisk væv i bughinde	KJAL20
Anden lokal operation på bughinde og bughule	KJAL96

Ekstensiv excision af peritoneum	KJ AQ00
Diafragma resektion	KJ AQ01
OMENT	
Omentektomi	KJ AL30
Infracolisk omentektomi	KJ AL30A
Supracolisk omentektomi	KJ AL30B
Omentbiopsi	KJ AL32
TARM	
Tyndtarmsresektion	KJ FB00
Ileocaecal resektion	KJ FB20
Højresidig hemikolektomi	KJ FB30*
Resektion af colon transversum	KJ FB40
Venstresidig hemikolektomi	KJ FB43
Resektion af colon sigmoideum	KJ FB46
Resektion af colon sigmoideum med kolostomi	KJ FB60
Entero-enterostomi (tyndtarmsanastomose)	KJ FC00
Kolorektostomi (primær anastomose mellem kolon og rektum)	KJ FC50
Kolektomi og iliorektostomi	KJ FH00
Kolektomi og ileostomi	KJ FH10
Anden kolektomi	KJ FH96
Resektion af endetarm	KJ GB00
Resektion af endetarm med kolostomi	KJ GB10
Resektion af endetarm og anlæggelse af ileostomi	KJ GB40
Ventrikel resektion	
Ventrikelresektion m. anden rekonstruktion	KJ DC96
Appendektomi	
Appendektomi	KJ EA00
LEVER	
Biopsi af lever	KJ JA20
Resektion af patologisk væv i lever	KJ JA40
Destruktion af patologisk væv i lever	KJ JA43
Kileresektion af lever	KJ JB00
Resektion af et leversegment	KJ JB10
Anden leverresektion	KJ JB96

Kolecystektomi	
Kolecystektomi	KJKA20
MILT	
Abdominal splenektomi	KJMA10
URINBLÆRE	
Biopsi af urinblære	KKCB00
Resektion af urinblære	KKCD10
Anden resektion eller destruktion af patologisk væv på urinblære	KKCD96
URINLEDER	
Resektion af urinleder	KKBD00
Anden resektion eller destruktion af væv på urinleder	KKBD96
Ureteroureterostomi (anastomose urinleder)	KKBH06
Replantation af urinleder	KKBH20

Eksempel:

Primær operation, laparotomi, makroskopisk radikal operation med primær anastomose, således LAP 3

Primær procedure kode: Total hysterektomi

KLCD00

Tillægskode: primær operation

KZD01

Tillægskode: LAP 3

VP0003

Tillægskode: makroradikalt indgreb (ikke efterladt tumorvæv)

ZPY1B02

Øvrige procedurekoder:

Dobbeltsidig salpingo-oophorektomi

KLAF10

Excision af paraaortale lymfeknuder

KPJD43

Excision af pelvine lymfeknuder

KPJD44

Extensiv excision af peritoneum

KJAQ00

Suprakolisk omentektomi

KJAL30B

Resektion af colon rektosigmoideum

KJFB46

Kolorektostomi (primær anastomose)

KJFC50